

dolodent

SOLUTION GINGIVALE

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE DOLODENT, solution gingivale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER DOLODENT, solution gingivale ?
3. COMMENT UTILISER DOLODENT, solution gingivale ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER DOLODENT, solution gingivale ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE DOLODENT, solution gingivale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

PRÉPARATIONS POUR L'ODONTO-STOMATOLOGIE - TRAITEMENT LOCAL À VISÉE ANTISEPTIQUE ET ANTALGIQUE

(A : appareil digestif et métabolisme)

Ce médicament est préconisé en application locale en cas de douleurs des gencives lors des poussées dentaires.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER DOLODENT, solution gingivale ?

N'utilisez jamais DOLODENT, solution gingivale en cas d'allergie connue aux anesthésiques locaux et aux autres constituants.

Faites attention avec DOLODENT, solution gingivale :

- Respectez les conseils d'utilisation et la posologie préconisée dans cette notice.
- CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN en cas d'aggravation des symptômes (en particulier, si la fièvre augmente, si la douleur est importante).
- CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN en l'absence d'amélioration au bout de 5 jours.
- Ne pas utiliser de façon prolongée en raison de la présence d'un anesthésique local (l'amyléine).

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que ce médicament contient un principe actif (anesthésique local) pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

3. COMMENT UTILISER DOLODENT, solution gingivale ?

UN AVIS MEDICAL DOIT ÊTRE DEMANDÉ AVANT L'APPLICATION DE CE MÉDICAMENT

Posologie

Deux à trois applications par jour sur la gencive douloureuse en massant doucement avec le doigt propre.

Mode et voie d'administration

Usage local strict. Voie gingivale.

Ce médicament doit être appliqué localement. Ne pas avaler.

Fréquence d'administration

Deux à trois applications par jour.

Durée du traitement

Le traitement ne devra pas dépasser 5 jours sans avis médical.

Si vous avez pris plus de DOLODENT, solution gingivale que vous n'auriez dû :

Un surdosage n'est pas attendu dans les conditions normales d'utilisation de cette solution gingivale.

Si vous oubliez de prendre DOLODENT, solution gingivale :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Possibilité de réactions allergiques : réactions cutanées, gonflement du visage. Dans ce cas, arrêter le traitement et prévenir le médecin.

Déclaration des effets indésirables

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER DOLODENT, solution gingivale ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser DOLODENT, solution gingivale après la date de péremption mentionnée sur le flacon.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient DOLODENT, solution gingivale ?

La substance active est :

Chlorhydrate d'amyléine 0,75 g

Pour 100 g de solution

Les autres composants sont :

Glucose liquide, miel, glycérol, acide ascorbique, arôme caramel (monopropylène glycol, eau, vanilline, pipéronal, maltol, acide lactique, MCP hydratée, acétylméthylcarbinol, dodécalactone delta, heptalactone gamma, triacétine), eau purifiée.

Qu'est-ce que DOLODENT, solution gingivale et contenu de l'emballage extérieur ?

Solution gingivale, flacon de 27 g.

Titulaire / Exploitant / Fabricant

LABORATOIRES GILBERT

928 Avenue du Général de Gaulle

14200 Hérouville Saint-Clair, France

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Décembre 2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).